

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina	Škodlivý činiteľ	Koncentrácia v %	Dávka na 1m2	Čakacia lehota v dňoch	Povolené kombinácie a poznámky
<u>vinič</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>ríbezle</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>maliny</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>egreše</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>černice</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>jahody</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred pučaním plodiny do fázy konca kvitnutia. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.
<u>zemiaky</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	7 dní	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred vzchádzaním plodiny do fázy odumretia listov a byle. Aplikuje sa rozhodením na povrch pôdy.

<u>cvikla</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy rozvinutia 5. listu. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>okružhlica</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy rozvinutia 5. listu. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>karfiol</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy začiatku tvorby postreenných púčikov, začiatku tvorby hlávok. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>brokolica</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy začiatku tvorby postreenných púčikov, začiatku tvorby hlávok. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>keľ rúžičkový</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy začiatku tvorby postreenných púčikov, začiatku tvorby hlávok. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>kapusta hlávková</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy začiatku tvorby postreenných púčikov, začiatku tvorby hlávok. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>šalát</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom, prípadne výsadbou plodiny do fázy zapojenia porastu na 10%, alebo do začiatku tvorby

					hlavičky, dva najmladšie listy sa nerozvinuly. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>špenát</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom, prípadne výsadbou plodiny do fázy zapojenia porastu na 10%, alebo do začiatku tvorby hlavičky, dva najmladšie listy sa nerozvinuly. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>bylinky</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom, prípadne výsadbou plodiny do fázy zapojenia porastu na 10%, alebo do začiatku tvorby hlavičky, dva najmladšie listy sa nerozvinuly. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>hrach</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom plodiny do fázy rozvinutia 5. pravého listu alebo rozvinutých 5. uponkou. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>fazuľa</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom plodiny do fázy rozvinutia 5. pravého listu alebo rozvinutých 5. uponkou. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>artičoka</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred sejbou, prípadne výsadbou plodiny do fázy hlavného kvetenstva, ktoré je zhora viditeľné v strede najvyšších listov. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>kukurica</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom plodiny do fázy rozvinutia 5. pravého listu. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.

<u>trávnaté plochy</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom až do kosenia porastu alebo do fázy vegetačného pokoja. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.
<u>okrasné rastliny</u>	<u>Slimáky a Slizniaky</u>		0,5g	AT	pri prvých výskytoch škodcu alebo 7 dní pred výsevom, prípadne výsadbou rastliny až do rezu kvetín alebo do fázy vegetačného pokoja. Aplikuje sa rozhodnutím na povrch pôdy.

Ak je v stĺpci ochranná lehota, alebo čakacia doba namiesto počtu dní uvedená skratka AT, v tom prípade sa prípravok aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne, alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny. Za stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do zberu, alebo konzumácie ošetrovanej plodiny a nemalo by dôjsť k ohrozeniu zdravia konzumenta.